



СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ХВОРИХ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ II типу



Л.М., Хавалкіна, К.О.Удальцова, Н.І. Дігтяр, Н.Д. Герасименко
Полтавський державний медичний університет
Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Мета



Привернути увагу лікарів-стоматологів і лікарів-інтерністів до стоматологічного статусу хворих із цукровим діабетом II типу та способів профілактики і лікування стоматологічної патології.

Матеріали і методи

Спостереженню підлягали 42 пацієнти. Першу групу склали хворі, які звернулися на кафедру внутрішньої медицини №3 з фтізіатрією, 26 пацієнтів віком 29-40 років. До другої групи увійшли хворі, що звернулися на кафедру післядипломної освіти лікарів-стоматологів, 16 пацієнтів віком від 45 до 60 років. До третьої групи увійшли 10 хворих старші 60 років. В кожній групі провели огляд: збір анамнезу, оцінку стоматологічного статусу, стан серцево-судинної системи (об'єктивний огляд, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові та ЕКГ). Досліджували інтенсивність ураження зубів карієсом. З цією метою визначали індекс КПВ. Оцінку рівня гігієни порожнини рота проводили за динамікою індексу гігієни порожнини рота ОНІ-S. Оцінку динаміки запального процесу в яснах проводили за індексом РМА. Визначали стан слизової оболонки порожнини рота. Об'єктивне обстеження проводилось згідно до рекомендацій ВООЗ, конкретизуючи стан СОПР: її вигляд, колір, рельєф, наявність елементів ураження, їх локалізацію, характеристику, ступінь болючості.

Результати

Оцінюючи результати клінічних досліджень, ми виявили, що у пацієнтів, які увійшли до третьої групи була діагностована патологія зубоцелепної системи (ЗЩС) у 100% обстежуваних. Найпоширенішими стали: захворювання пародонту та слизової оболонки порожнини рота - 68%, карієс та його ускладнення - 22%, часткова – 28% або повна – 17% втрата зубів. Серед захворювань серцево-судинної системи було виявлено: ішемічну хворобу серця та хронічну серцеву недостатність. У першій групі було значно менше патології ЗЩС, із них найчисленішими були карієс та його ускладнення – 68%, захворювання пародонту та СОПР – 58%, часткова втрата зубів - 2%. Усі пацієнти потребували лікування стоматологічної патології.



Діаграма 1. Результати дослідження індексу РМА, ОНІ-S та індексу КПВ у пацієнтів різних вікових груп

Вікова група	індекс РМА	ОНІ-S	КПВ
29-40	24,3±2,2	1,85±0,15	8,30
45-60	41,2±4,5	3,15±0,53	16,30
Старше 60	62,3±5,1	5,62±0,61	20,30

Таблиця 1. Результати дослідження індексу РМА, ОНІ-S та індексу КПВ у пацієнтів різних вікових груп

Висновок

Хворі із цукровим діабетом II типу мають високу інтенсивність карієсу та хвороб пародонта. Індекс КПВ у них в середньому в два рази вище, ніж у осіб без супутньої патології. В структурі захворювань пародонта частіше всього зустрічається періодонтит. У досліджуваних хворих, як правило, відсутня раціональна гігієна порожнини рота і спостерігається висока потреба в профілактиці та комплексному стоматологічному лікуванні із залученням лікарів-інтерністів.