

Травматичні ушкодження м'яких тканин, зубів, щелеп, кісток обличчя

1. Жінка віком 38 років звернулася зі скаргами на наявність рани в ділянці щоки справа. Травму отримала приблизно 17 годин тому, свідомість не втрачала. Об'єктивно в ділянці щоки справа спостерігається порушення цілісності шкіри, підшкірно-жирової клітковини і м'яза довжиною 2,5 см, кровотеча з рани. Яку хірургічну обробку рани треба провести пацієнтці відповідно до терміну травми?

- A.* Рання ПХО рани
- B. Вторинна хірургічна обробка рани
- C. –
- D. Відтермінована ПХО рани
- E. Пізня хірургічна обробка рани

2. Під час препарування зуба 36 під провідниковим знеболенням, інструментом було травмовано стінку й бокову поверхню язика (поріз розміром 1-1,5 см), почалася кровотеча. Які дії лікаря-стоматолога у цьому разі?

- A. Викликати лікаря-хірурга
- B.* Зупинити кровотечу, накладити шви на рану, закінчити обробку
- C. Провести тампонаду й припинити препарування
- D. Закінчити препарування й відправити пацієнта додому
- E. –

3. За 4 години після падіння на прогулянці, мати дитини віком 1,8 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на «відсутність» у дитини центральних верхніх зубів. Об'єктивно спостерігається: різучі краї 51, 61 зубів на рівні маргінального краю ясен, ясна гіперемовані, набряклі, різко болісні під час пальпації. Встановіть попередній діагноз.

- A. Забиття 51, 61 зубів
- B. Повний вивих 51, 61 зубів
- C. Перелом коренів 51, 61 зубів
- D.* Вколочений вивих 51, 61 зубів
- E. Перелом коронок 51, 61 зубів

4. У пацієнта односторонній лінійний перелом у ділянці кута нижньої щелепи. Проведено іммобілізацію з накладанням двощелепної назубної дротяної шини із зачіпними петлями і міжщелепним еластичним витягуванням. Загоєння проходило без ускладнень. Через який оптимальний термін можна зняти шину?

- A. 10 днів
- B.* 3 тижні
- C. 1 тиждень
- D. 1 місяць
- E. 2 тижні

5. Військовослужбовця доставили на етап кваліфікованої допомоги з опіковою травмою обличчя. На фоні гіперемованої шкіри обличчя виявлено пухирі різної величини, заповнені прозорою рідиною. Який ступінь опіку шкіри обличчя у пацієнта?

- A. IV
- B. I
- C. III-Б
- D. * II
- E. III-А

6. У відділення дитячої стоматології госпіталізовано дев'ятирічну дитину із травмою зубів верхньої щелепи. Встановлено діагноз: повний вивих 11 зуба. Які методи лікування треба застосувати у цьому разі?

- A. Ортодонтичне лікування
- B. * Реплантацію
- C. Виготовлення мостоподібного протезу
- D. Імплантацію
- E. Видалення зуба

7. Чоловік віком 34 роки отримав наскрізне поранення в ділянці нижньої щелепи. Об'єктивно спостерігається двобічний ментальний перелом нижньої щелепи з вираженим зміщенням центрального фрагменту назад, кровотеча з раневого каналу незначна, свідомість збережена, пацієнт скаржиться на утруднене дихання, зростає дихальна недостатність. Чим спричинене утруднення дихання у постраждалого?

- A. Розвитком стенотичної асфіксії
- B. Розвитком дислокаційної асфіксії
- C. Розвитком травматичного шоку
- D. Розвитком геморагічного шоку
- E.* Поєднаною черепно-щелепно-лицевою травмою

8. Пацієнту віком 36 років встановлено діагноз: перелом нижньої щелепи між 32-31 зубами. Рентгенологічно діагноз підтверджений. До якого типу переломів відноситься цей клінічний випадок, враховуючи, що перелом у межах зубного ряду?

- A. Прямий
- B. *Відкритий
- C. Одиночний
- D. Закритий
- E. Косий

9. У пацієнтки віком 26 років спостерігається утруднене мовлення, рот напіввідкритий, центральна лінія зміщена праворуч, перед козелком вуха зліва – западина, під виличною дугою - вип'ячування. Який попередній діагноз?

- A. *Лівобічний передній вивих нижньої щелепи
- B. Двобічний передній вивих нижньої щелепи
- C. Правобічний передній вивих нижньої щелепи
- D. -
- E. Задній вивих нижньої щелепи

10. Жінці віком 68 років діагностовано перелом нижньої щелепи справа в ділянці кута зі зміщенням відламків. Об'єктивно спостерігається: асиметрія обличчя за рахунок посттравматичного набряку, при пальпації відзначається рухомість уламків у ділянці перелому та біль. Кількість зубів на щелепах та їх якість достатня для консервативного лікування. З анамнезу відомо: епілепсія з народження, епілептичні напади щомісяця. Який метод лікування запропонуєте?

- A. Імобілізація шиною Ванкевича
- B. Імобілізація щелеп шинами Васильєва
- C. Імобілізація шиною Порта
- D.* Osteosynthesis
- E. Імобілізація щелеп шинами Тігерштедта

11. У пацієнта віком 40 років унаслідок травмування визначається рухливість кісток носа, спостерігається набряк м'яких тканин лівої виличної ділянки, крововилив у склеру лівого ока, наявні симптоми сходінки по нижньому краю орбіти з обох боків, відкритий прикус та носова кровотеча. Встановіть попередній діагноз.

- A. Перелом верхньої щелепи по Ле Фор III
- B. Перелом верхньої щелепи по Ле Фор I
- C. Перелом кісток носа
- D. *Перелом верхньої щелепи по Ле Фор II
- E. –

12. Пацієнта 38 років госпіталізовано до лікарні за 2 години після ДТП. Об'єктивно спостерігається: середня третина обличчя видовжена, сплюснена, садна шкіри обличчя, крововилив у підочних ділянках, рот напіввідкритий, носова кровотеча. Змикання зубів верхньої та нижньої щелепи тільки в ділянці останніх молярів. Під час пальпації спостерігається біль і рухомість верхньої щелепи та кісток носа. Поставте попередній діагноз.

- A. *Перелом верхньої щелепи по Ле Фор II
- B. Перелом вилицевих кісток
- C. Перелом верхньої щелепи по Ле Фор III
- D. Перелом верхньої щелепи по Ле Фор I

Е. Перелом кісток носа

13. Водій-механік із підбитого танка доставлений на етап кваліфікованої допомоги з опіковою травмою обличчя. На фоні гіперемованої та набряклої шкіри обличчя виявлено пухирі різної величини, заповнені прозорою рідиною. Який ступінь опіку шкіри обличчя спорстерігається?

- А. III-A ступінь
- В. I ступінь
- С. III-B ступінь
- Д. * II ступінь
- Е. IV-A ступінь

14. Після травми пацієнтка віком 30 років скаржиться на припухлість і відсутність чутливості у лівій підочній ділянці. Під час огляду виявляється набряк м'яких тканин обличчя зліва, крововилив у нижню повіку, відкривання рота обмежене до 2 см, симптом «сходинки» по лівому нижньоочному краю. Який попередній діагноз?

- А. Перелом кісток носа
- В. Перелом лівої виличної дуги
- С. *Перелом лівої виличної кістки
- Д. Перелом передньої стінки гайморової пазухи зліва
- Е. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II

15. Пацієнтка госпіталізована до стаціонару щелепно-лицевої хірургії з діагнозом: перелом верхньої щелепи, поєднаний із переломом основи черепа. Який основний симптом свідчить про перелом основи черепа?

- А. Випадіння чутливості у ділянці підочномкового нерва
- В. Кровотеча із зовнішнього слухового проходу
- С. Симптом «окулярів»
- Д. Кровотеча з носа
- Е. *Лікворея

16. Під час транспортування постраждалого чоловіка 42 років із двостороннім травматичним переломом нижньої щелепи, для іммобілізації уламків застосували міжщелепне лігатурне зв'язування за методом Айві. Укажіть, на який крайній термін застосовується цей вид тимчасової іммобілізації?

- А. На термін до 2 тижнів
- В. На термін до 1 тижня
- С. На термін до 1 доби
- Д. На термін до 12 годин
- Е. *На термін до 5 днів

17. Під час обстеження пацієнта віком 23 роки із множинними травмами після дорожньо-транспортної пригоди виникла підозра на перелом верхньої щелепи

II типу за Ле-Фор. У якій проєкції треба зробити рентгенограму черепа для встановлення остаточного діагнозу?

- A. Рентгенограму нижньої щелепи у прямій проєкції
- B. Рентгенограму придаткових пазух носа
- C. Рентгенограму за Шюллером
- D. *Рентгенограму черепа в аксіальній проєкції
- E. Рентгенограму кісток носа

18. Хлопчик віком 12 років годину тому під час гри у футбол отримав травму. Скаржиться на рухомість верхніх передніх різців та біль, який посилюється під час накушування. Об'єктивно спостерігається: рухомість 11, 21 зубів II ступеня, коронки зубів інтактні, зміщені в оральну сторону. На рентгенограмі визначається розширення періодонтальної щілини 11, 21 зубів. Установіть діагноз.

- A. Травматичний періодонтит 11, 21 зубів
- B. *Неповний вивих 11, 21 зубів
- C. Відлам верхівки коренів 11, 21 зубів
- D. Інтрузивний вивих 11, 21 зубів
- E. Горизонтальний перелом коренів 11, 21 зубів у середній частині

19. Рятувальники звільнили з-під завалів зруйнованого будинку підлітка 18 років із численними ушкодженнями м'яких тканин обличчя та госпіталізували його до щелепно-лицевого відділення, де було проведено відповідну хірургічну обробку ран, які не мали виражених ознак запалення. Накладені первинні глухі шви та профілактично призначено антибіотики. Який вид хірургічної обробки ран проведено?

- A. Повторна хірургічна обробка
- B. Вторинна хірургічна обробка
- C. Відкладена первинна хірургічна обробка
- D. *Рання первинна хірургічна обробка
- E. Пізня первинна хірургічна обробка

20. У пацієнта віком 27 років унаслідок побутової травми стався перелом у боковій ділянці тіла нижньої щелепи зліва зі зміщенням. Об'єктивно спостерігається: цілісність зубного ряду збережена, лінія перелому проходить між 36 і 37 зубами. Яку шину треба застосувати для постійної іммобілізації щелепи?

- A. Міжщелепне лігатурне зв'язування за методом Айві
- B. *Двощелепна назубна шина Тігерштедта із зачіпними гачками, міжщелепна гумова тяга
- C. Гладка шина -скоба
- D. Апарат Рудько

Е. Двощелепна назубна шина Тігерштедта із розпірковим вигином, міжщелепна гумова тяга

21. Чоловік віком 37 років скаржиться на рухомість 11 зуба, болісні відчуття під час накушування, які з'явилися після травми напередодні. Під час конусно-променевого томографічного обстеження виявлена поздовжня фрактура кореня 11 зуба. Який метод лікування потрібно обрати?

- А. Резекція верхівки кореня
- В. Ендодонтичне лікування, пломбування МТА
- С. Ендодонто-ендоосальна імплантація
- Д. -
- Е. *Видалення зуба

22. Батьки чотирирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у передньому зубі верхньої щелепи дитини, зміну його положення, неможливість відкушування їжі. Декілька годин тому хлопчик отримав травму обличчя. Об'єктивно спостерігається: конфігурація обличчя не змінена, на шкірі нижньої губи та підборідді садно, слизова оболонка нижньої губи травмована, 51 зуб рухомий II ступеня, зміна його положення у сагітальному і трансверзальному напрямках. На рентгенограмі визначається рівномірне розширення періодонтальної щілини 51 зуба. Яка тактика лікаря після обробки рани?

- А. Професійна гігієна порожнини рота
- В. Ендодонтичне лікування 51 зуба
- С. *Видалення 51 зуба
- Д. Шинування зубів верхньої щелепи
- Е. Динамічне спостереження

23. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на утруднене вживання їжі через травмування слизової оболонки альвеолярного відростка нижньої щелепи під час користування бюгельним протезом. Протез виготовлений тиждень тому. Об'єктивно спостерігається: після зняття протеза на рівні перехідної складки у ділянці 45, 46 зубів із язикового боку наявна болюча виразка розміром 1,5х3 мм, з нерівними краями, що кровоточить від дотику. Який імовірний діагноз?

- А. Трофічна виразка
- В. *Декубітальна виразка
- С. Актиномікотична виразка
- Д. Сифілітична виразка
- Е. Туберкульозна виразка

24. Чоловіка віком 45 років шпиталізовано до лікарні з місця ДТП з діагнозом: забійно-рвана рана щоки, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. До яких травм відносяться ці множинні пошкодження?

- A. *Поєднаних
- B. Комбінованих
- C. Поодиноких
- D. Множинних
- E. Ізольованих

25. До лікаря-стоматолога звернулися батьки дев'ятирічної дівчинки зі скаргами на біль у фронтальній ділянці верхньої щелепи та відсутність зуба у дитини через травму обличчя під час спортивних змагань. Об'єктивно спостерігається: 11 зуб відсутній, 21 зуб зміщений у бік відсутнього 11 зуба. На рентгенограмі виявлено розширення періодонтальної щілини 21 зуба. Який імовірний діагноз?

- A. Повний вивих 21 зуба, перелом кореня 11 зуба
- B. *Повний вивих 11 зуба, неповний вивих 21 зуба
- C. Неповний вивих 11 зуба, перелом коронки 21 зуба
- D. Вбитий вивих 11 зуба, повний вивих 21 зуба
- E. Вбитий вивих 21 зуба, повний вивих 11 зуба

26. Чоловік віком 54 роки після травми скаржиться на кровотечу з носа, порушення чутливості верхньої губи справа, деформацію обличчя, обмеження відкривання рота. Під час пальпації кісток лицевого скелета спостерігається симптом «сходінки» по нижньому краю орбіти та у ділянці вилично-альвеолярного гребеня справа. Рентгенологічно визначається завуальованість верхньощелепного синуса справа. Який імовірний діагноз?

- A. Перелом кісток носа
- B.* Перелом виличної кістки справа
- C. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III
- D. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I
- E. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II

