

ПЕРЕДРАКИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТА ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ

1. У дівчинки віком 14 років на вестибулярній поверхні ясен у ділянці 44 та 45 зубів виявлено новоутворення на ніжці, вкрите шорсткою білуватою слизовою оболонкою, розміром 3x7 мм. Під час дотику не кровоточить. Встановіть діагноз.

- A.* Папілома
- B. Залози Серра
- C. Гемангіома
- D. Фіброма
- E. Ретенційна кіста

2. Жінка віком 47 років звернулася зі скаргами на наявність виразкового дефекту слизової оболонки нижньої губи, що розташовується ближче до її середини. Упродовж 3-х років пацієнтка спостерігає самостійне загоювання та виникнення виразкового дефекту. Об'єктивно спостерігається: на червоній облямівці нижньої губи ерозія подовженої форми з гладкою, полірованою поверхнею, яскраво-червоного кольору. Запальний інфільтрат виражений дуже слабо. Пальпація безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.* Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті
- B. Лейкоплакія, ерозивна форма
- C. Червоний плесканий лишай, ерозивна форма
- D. Хвороба Боуена
- E. Ексфоліативний хейліт

3. Вкажіть нозологічні форми патології зубощелепної системи, що не підлягають ортопедичному лікуванню.

- A.* Лейкокератоз
- B. Конвергенція зубів
- C. Артрит
- D. Пародонтит
- E. Феномен Попова-Годона

4. Чоловіку віком 35 років після патогістологічного дослідження встановлено діагноз: абразивний преканцерозний хейліт Манганотті. Яке місцеве лікування треба призначити пацієнту найперше?

- A.* Аплікації кератопластичними препаратами
- B. Аплікації антибактеріальними препаратами
- C. Аплікації протівірусними препаратами
- D. Аплікації протизапальними препаратами
- E. Аплікації антисептичними препаратами

5. Жінці віком 48 років, яка хворіє на цукровий діабет та гіпертонічну хворобу під час лікування карієсу 37 зуба лікар-стоматолог на незмінній слизовій оболонці в ретромоларній ділянці щік виявив ділянки білуватого

кольору, які мають вигляд мережива. Під час зішкрібання не видаляються. Встановіть попередній діагноз.

- A.*Червоний плескатий лишай
- B.Гострий псевдомембранозний кандидоз
- C.Лейкоплакія
- D.Червоний вовчак
- E.Хронічний гіперпластичний кандидоз

6. Зі скаргами на підвищення температури тіла до 39°C, біль у горлі, висипаннями на губах та у роті у стоматологічну клініку звернувся чоловік 42-х років. Об'єктивно: на тлі набряклої та гіперемованої слизової оболонки порожнини рота - плями, папули, пухирі та ерозії, вкриті жовтувато-сірим нальотом. На червоній облямівці губ масивні геморагічні кірки. Який попередній діагноз?

- A.*Багатоформна ексудативна еритема
- B.Герпетичний стоматит
- C.Пухирчатка
- D.Вторинний сифіліс
- E.Первинний сифіліс

7. У хворого 62-х років на нижній губі розташовується новоутворення, що існує вже 2 місяці і за цей час збільшилося до 1,5 см в діаметрі. Рухоме, не спаяне з підлеглими тканинами, у його центрі наявна кратероподібна западина, обмежена щільним валиком і заповнена роговими масами й пухкими лусочками буро-жовтого кольору, що легко знімаються, пальпація безболісна, регіонарні лімфовузли не змінені. Який імовірний діагноз?

- A.*Кератоакантома
- B.Бородавчатий передрак
- C.Лейкоплакія
- D.Обмежений гіперкератоз
- E.Шкірний ріг

8.Пацієнтка віком 58 років сскаргиться на наявність новоутворення на щоці, що виникло місяць тому. Об'єктивно спостерігається: на шкірі правої щоки вузол середньої щільності, червонуватого кольору, діаметром 1 см, з кратероподібною западиною в центрі, заповненою роговими масами. Який попередній діагноз?

- A.*Кератоакантома
- B.Атерома
- C.Базаліома
- D.Папілома
- E.Шкірний ріг

9. У пацієнта віком 52 років під час профілактичного огляду лікарем-стоматологом виявлено: на червоній облямівці нижньої губи ділянка

полігональної форми до 0,8 см, вкрита тонкими щільно розташованими лусочками сірувато-коричневого кольору. Під час пальпації вогнище ураження безболісне, м'яке в основі, не виступає над рівнем навколишніх тканин. Який імовірний діагноз?

- A.*Передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ
- B.Бородавчатий передрак
- C.Хвороба Боуена
- D.Лейкоплакія
- E.Червоний плоский лишай

10.Чоловік віком 35 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність новоутворення на нижній губі. Об'єктивно на незмінній червоній облямівці нижньої губи зліва спостерігається напівкулястої форми вузол діаметром 0,6 см, рівнем червоної облямівки, вкритий сірими лусочками. Пальпація безболісна. Який попередній діагноз?

- A.*Бородавчатий передрак
- B.Передраковий гіперкератоз червоної облямівки губи
- C. Кератоакантома
- D.Піогенна гранульома
- E. Папілома

11.Пацієнт віком 45 років скаржиться на наявність білої плями на щоці, яку помітив близько 2-х місяців тому. Об'єктивно спостерігається: на слизовій оболонці щоки по лінії змикання зубів ділянка білуватого кольору із чіткими краями, що не виступає над рівнем слизової оболонки, під час зскрібання не знімається. Пальпація безболісна. Навколишня слизова оболонка не змінена. Який імовірний діагноз?

- A.*Лейкоплакія
- B.Червоний плоский лишай
- C.Хронічний гіперпластичний кандидоз
- D.Червоний вовчак
- E.Обмеження передраковий гіперкератоз

12. Чоловік віком 56 років скаржиться на шоркість слизової оболонки порожнини рота у ділянці щік та язика. Об'єктивно спостерігається: висипання на слизовій оболонці щік ретромоллярної ділянки у вигляді сіро-білих папул із нальотом, які зливаються у кільця та дуги. Під час пальпації регіонарних лімфовузлів патологічних змін не виявлено. Який попередній діагноз?

- A.*Червоний плоский лишай
- B.Лейкоплакія
- C.Червоний вовчак
- D.Хронічний кандидоз
- E.Вторинний сифіліс

13. Чоловік віком 50 років скаржиться на наявність новоутворення на верхній губі. Об'єктивно на шкірі верхньої губи спостерігається одиночний вузол гіперкератозу, що підвищується над рівнем навколишніх тканин, конічної форми, діаметром 0,4 см, безболісний під час пальпації, сірого кольору, має пошарову будову. Установіть попередній діагноз.

- A. *Шкірний ріг
- B. Хвороба Боуена
- C. Бородавчастий передрак
- D. Папілома
- E. Кератоакантома

14. Хворий 44-х років скаржиться на наявність на нижній губі безболісної ділянки білуватого кольору. Об'єктивно: на червоній облямівці нижньої губи справа ближче до центра визначається різко обмежена ділянка полігональної форми розміром 0,5х1,0 см. Поверхня вогнища ураження має сірувато-білий колір, вкрита щільно сидячими дрібними лусочками. Навколишні тканини не змінені. Пальпація зміненої ділянки безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Обмежений передраковий гіперкератоз
- B. Лейкоплакія, плоска форма
- C. Кандидозний хейліт
- D. Червоний вовчак
- E. Червоний плескатий лишай

15. Під час огляду в чоловіка 50-ти років, який палить, була виявлена ділянка гіперкератозу на нижній губі на фоні незміненої слизової оболонки розміром 0,5х1,0см з чіткими контурами без порушення кольору. Який додатковий метод обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?

- A. *Цитологічне дослідження
- B. Мікробіологічне дослідження
- C. Загальний аналіз крові
- D. Імунологічне дослідження
- E. Серологічне дослідження