

Захворювання СНЩС

1. Пацієнтка віком 59 років скаржиться на ниючий біль у ділянці лівого СНЩС, скутість у суглобі зранку, відчуття закладеності у лівому вусі. Під час внутрішньо- ротового огляду виявлено часткову адентію. На рентгенограмі СНЩС спостерігається: суглобова щілина місцями різко звужується, суглобовий горбик згладжений, глибина суглобової ямки зменшена, суглобові поверхні не рівні. Яку патологію СНЩС можна діагностувати у цьому разі?

- *А. Артроз
- В. Хронічний артрит
- С. Гострий артрит
- Д. Больову дисфункцію
- Е. Анкілоз

2. Пацієнту віком 54 роки встановлено діагноз: синдром Костена. Якою патологією СНЩС зумовлене це захворювання?

- А. Больовою дисфункцією
- В. Артритом
- С. Анкілозом
- *Д. Посттравматичними проявами
- Е. Артрозом

3. Пацієнт віком 61 рік скаржиться на утруднене відкривання рота внаслідок забою СНЩС та біль у ділянці третього моляру нижньої щелепи. Яка техніка знеболювання буде доцільна у цьому клінічному випадку для розблокування щелепи?

- *А. За Вазірані-Акінозі
- В. За Вейсбремом
- С. -
- Д. За Гоу-Гейтсом
- Е. За Вейсблатом

4. Чоловік віком 40 років скаржиться на біль у ділянці лівого слухового проходу та хрускіт у лівому скронево-нижньощелепному суглобі. Об'єктивно спостерігається: обличчя симетричне, пропорційне, рухи нижньої щелепи мають девіацію та викликають біль. Під час внутрішньоротової пальпації відчувається напруженість латеральних крилоподібних м'язів. На комп'ютерній томографії структури суглобових поверхонь рівні та гладкі, патологічних змін не виявлено. Який імовірний діагноз?

- А. Хронічний артрит СНЩС
- В. Ревматичний артрит СНЩС
- С. Анкілоз СНЩС

- *D. Дисфункція СНЩС
- E. Деформуючий артроз СНЩС

5. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на біль і припухлість у ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба. Із анамнезу відомо, що 2 дні тому вона дуже широко відкрила рот під час їжі та відчула сильний біль у ділянці суглоба. Об'єктивно спостерігається припухлість у ділянці лівого суглоба, пальпація болюча, відкривання рота дещо обмежене та болісне. Назвіть найбільш імовірний діагноз.

- A. Юнацька дисфункція лівого СНЩС
- B. Анкілоз лівого СНЩС
- C. Хронічний артрит лівого СНЩС
- D. Артроз лівого СНЩС
- *E. Гострий артрит лівого СНЩС

6. Яке анатомічне утворення скронево-нижньощелепного суглоба забезпечує компенсацію інконгруентності поверхонь та широкий діапазон руху нижньої щелепи?

- A. Суглобова ямка
- *B. Суглобовий диск
- C. Хрящове покриття суглоба
- D. Капсула суглоба
- E. Суглобовий горбок

7. У пацієнта віком 43 роки під час повторного обстеження з приводу ускладненого вивиху СНЩС клінічно та рентгенологічно діагностовано перелом кісткової стінки зовнішнього слухового проходу. При якому вивиху СНЩС лікар-стоматолог виявляє це ускладнення?

- *A. Задньому
- B. Передньому
- C. Застарілому
- D. Звичному
- E. Гострому

8. Жінка віком 42 роки скаржиться на шурхотіння, лускіт біля вуха, обмеженість рухів нижньої щелепи зранку, біль під час жування. Об'єктивно спостерігається: рухи нижньої щелепи S-подібні, відкривання рота в повному обсязі. На томограмі виявлено: суглобова ямка скронево-нижньощелепного суглоба плеската, шийка суглобового відростка вкорочена, на поверхні суглобової голівки - екзостози. Діагностуйте захворювання у пацієнтки.

- A. Больова дисфункція

- В. Фіброзний анкілоз
- С. Хронічний артрит
- Д. Кістковий анкілоз
- *Е. Деформуючий артроз

9. Хлопець віком 17 років скаржиться на різко обмежене відкривання рота, утруднене приймання їжі, асиметрію обличчя. З анамнезу з'ясовано: травма у віці 10 років — падіння зі сходів. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, підборіддя зміщене вліво і назад (лівобічна мікрогенія). Відкривання рота до 2 см, передні зуби розміщені віялоподібно (вестибулярно), прикус глибокий. Під час пальпації суглобових головок виявляється незначна рухомість правої суглобової голівки, ліва — нерухома. Поставте попередній діагноз.

- А. Гострий травматичний артрит лівого СНЩС
- В. Деформуючий артроз СНЩС
- *С. Анкілоз лівого СНЩС
- Д. Контрактура нижньої щелепи
- Е. Лівобічний вивих СНЩС

10. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на різкий біль у ділянці лівого СНЩС, який іррадіює у вухо, головний біль, погіршення загального стану, неможливість жування та обмежене відкривання рота. Об'єктивно спостерігається: обличчя несиметричне через набряк та гіперемію в ділянці лівого СНЩС. Біль посилюється за незначних рухів нижньої щелепи та під час пальпації СНЩС. Відкривання рота обмежене до 15 мм. Поставте попередній діагноз.

- А. Лівобічний вивих СНЩС
- *В. Гострий артрит лівого СНЩС
- С. Деформуючий артроз лівого СНЩС
- Д. Гострий гнійний паротит
- Е. Больова дисфункція СНЩС

11. Пацієнтку віком 60 років протягом року періодично турбує біль у ділянці лівого СНЩС під час рухів нижньої щелепи. Біль підсилюється наприкінці дня, з'являється після переохолодження або довготривалої розмови. Іноді спостерігається хрускіт у суглобі. Який попередній діагноз?

- А. Контрактура нижньої щелепи
- В. Артроз СНЩС
- С. Анкілоз СНЩС
- Д. Больова дисфункція СНЩС
- *Е. Хронічний артрит СНЩС

12. Жінка віком 50 років скаржиться на скутість рухів нижньої щелепи, яка зменшується надвечір, періодичний хрускіт у лівому скронево-нижньощелепному суглобі, обмежене відкривання рота. Рентгенологічно встановлено: суглобова голівка деформована внаслідок шипоподібних розростань. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A. Больова дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба
- B. Анкілоз лівого скронево-нижньощелепного суглоба
- C. -
- D. Хронічний артрит лівого скронево-нижньощелепного суглоба
- *E. Артроз лівого скронево-нижньощелепного суглоба