

Зміни СОПР при дерматозах

1. Жінка віком 56 років скаржиться на біль у дистальному відділі слизової оболонки щік і бічних поверхонь язика, що утруднює вживання їжі. Об'єктивно спостерігається: на слизовій оболонці щік та язика наявні вогнища гіперемії та ерозії, що кровоточать під час доторкання. Навколо ерозій виявлено зроговілі папули невеликих розмірів, які згруповані і з'єднані між собою кератинізованими містками, утворюючи сітчастий малюнок. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий псевдомембранозний кандидоз
- B. Лейкоплакія, м'яка форма
- C. Багатоформна ексудативна еритема
- D. Пухирчатка
- E. *Червоний плоский лишай, ерозивна форма

2. Пацієнтці 58 років, яка мала протягом 3 тижнів на слизовій оболонці порожнини рота яскраво-червоні ерозії, яким передували пухирі, лікар-стоматолог встановив попередній діагноз: вульгарна пухирчатка. Яке додаткове дослідження треба провести для уточнення діагнозу?

- A. Розгорнутий аналіз крові
- B. Полімеразна ланцюгова реакція
- C. *Цитологічне
- D. Мікробіологічне
- E. Біохімічне

3. Чоловік віком 65 років скаржиться на шорсткість слизової оболонки порожнини рота у ділянці щік та язика. Об'єктивно спостерігається: висипання на слизовій оболонці щік ретромолярної ділянки у вигляді сіро-блідих папул із нальотом, які зливаються у кільця та дуги. Під час пальпації регіонарних лімфовузлів патологічних змін не виявлено. Який попередній діагноз?

- A. *Червоний плоский лишай
- B. Червоний вовчак
- C. Лейкоплакія
- D. Хронічний кандидоз
- E. Вторинний сифіліс

4. Хворий 44-х років скаржиться на шорсткість слизової оболонки щоки, неприємні відчуття під час приймання їжі. Об'єктивно: на гіперемованій слизовій оболонці лівої щоки та в ретромолярній ділянці відмічається візерунчасте розташування білуватих нашарувань, що не знімаються. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A. Червоний вівчак
- B. Лейкоплакія
- C. М'яка лейкоплакія

D.Кандидозний стоматит

E.*Червоний плескатий лишай

5. До лікаря-стоматолога звернулась жінка 38-ми років зі скаргами на появу шорсткості на слизовій оболонці порожнини рота, печіння. Об'єктивно: на слизовій оболонці щоки папули білувато-рожевого кольору полігональної форми. Папули підіймаються над поверхнею слизової оболонки. Який діагноз можливо поставити?

A.Багатоформна ексудативна еритема

B.Пухирчатка

*Червоний плескатий лишай

C.Червоний вовчак

D.Синдром Шегрена

6. Хворий 50-ти років направлений на консультацію до хірурга-стоматолога. Об'єктивно: на СОПР папули у вигляді мереживних білуватих нашарувань. На їх фоні ерозії та виразки, які довго не загоюються. Навколо ерозій яскрава, червона еритема. Дно виразок вкрито нальотом брудно-сірого кольору, а їх краї припідняті, нерівні. При пальпації м'які, безболісні, кровоточать. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Ерозивно-виразкова форма червоного плескатоного лишая

B.Хронічна виразка СОПР

C.Ерозивно-виразкова форма лейкоплакії

D.Хейліт Манганотті

E.Пухирчатка

7.У пацієнтки К., 65 років, з'явилися ерозії на слизових оболонках порожнини рота і геніталій, а надалі на незмінній шкірі грудей і спини- міхури з в'ялими покришками і каламутним вмістом. При об'єктивному дослідженні дерматолог виявив позитивний симптом Нікольського. При мікроскопічному дослідження мазка-відбитку у вмісті свіжого міхура виявлені кулясті набряклі клітини з округлими ядрами, що мають гіперхромне базofilне забарвлення і оточені вузьким різко обкресленим віночком гомогенної протоплазми. Як називається даний різновид клітин?

A. Еозинофіли

B.* Клітини Тцанка

C. Атипові кератіноцити

D. Клітини Сезарі

E. Клітини Лангергансу

8. При огляді на шкірі тулуба у 53 літньої пацієнтки визначаються численні міхури, розташовані на незмінній шкірі, розмірами від 2 до 3 см в діаметрі. Покришка міхурів в'яла, вміст каламутний, позитивний симптом Нікольського. В міхурах що розкрилися спостерігаються ерозії на різних

стадіях епітелізації. З анамнезу відомо, що пацієнтка отримувала попереднє лікування антибактеріальними мазями і її стан різко погіршився. Після огляду лікар рекомендував виконати діагностичну біопсію. Які морфологічні ознаки в гістологічному препараті свідчатимуть про звичайну пухирчатку?

- A. Спонгіоз
- B. *Акантолізіс
- C. Вакуолізація
- D. Балонуюча дистрофія
- E. Акантоз

9. Хвора віком 54 роки направлена до стоматолога з діагнозом звичайна пухирчатка. Які клітини при цитологічному дослідженні вогнищ уражень підтвердять діагноз даного захворювання ?

- A. Клітини Пирогова –Лангганса
- B. * Клітини Тцанка
- C. LE- клітини
- D. Клітини Боткіна -Гумпрехта
- E. Клітини нейтрофільного ряду

10. Хвора віком 48 років скаржиться на біль під час споживання їжі. розмови. Об'єктивно: на губах геморагічні кірки, у кутах рота - болючі тріщини. На незмінній слизовій оболонці щік. піднебіння, дна порожнини рота- велика кількість ерозій. Симптом Нікольського позитивний. Гіперсалівація. Який найімовірніший попередній діагноз?

- A. Бульозний пемфігоїд
- B. Багатоформна ексудативна еритема
- C. Хронічний рецидивний герпес
- D. Герпетиформний дерматит Дюрінга
- E. *Звичайна пухирчатка

11. Хвора віком 63 роки скаржиться на наявність пухиря на слизовій оболонці м'якого піднебіння, неприємні відчуття під час споживання їжі. В анамнезі гіпертонічна хвороба з частими кризами. Об'єктивно: на гіперемованому тлі слизової оболонки м'якого піднебіння є пухир з кров'янистим вмістом. Симптом Нікольського негативний .У мазках -відбитках елементи периферійної крові, відсутність акантолітичних клітин. Який найімовірніший діагноз?

- A. Звичайна пухирчатка
- B. *Пухирно-судинний синдром
- C. Герпетиформний дерматит Дюрінга
- D. Бульозний пемфігоїд
- E. Червоний плоский лишай, пемфігоїдна форма

12. Хвора віком 53 роки скаржиться на біль у слизовій оболонці щоки і бічній поверхні язика справа. Об'єктивно: на слизовій оболонці щоки і язика є ерозії, які болючі і кровоточать при доторканні. Навколо ерозій на злегка

гіперемованій слизовій оболонці виявлено зроговілі папули розміром до 1 мм, які зливаються в сітчастий малюнок. Шпателем папули не знімаються. Який найімовірніший діагноз?

- A.*Червоний плоский лишай
- B. Багатоформна ексудативна еритема
- C. Звичайна пухирчатка
- D. Гострий псевдомембранозний кандидоз
- E. Лейкоплакія, м'яка форма

13. Хвора віком 53 роки скаржиться на відчуття стягнутості слизової оболонки порожнини рота, червоної облямівки губ і шкіри обличчя. Її шорсткуватість. Об'єктивно: ураження щік темно- червоного кольору, за формою має вигляд метелика. Червона облямівка губ інфільтрована, темно- червоного кольору, щільно вивпнєна гіперкератозними лусочками. При спробі їх зняти виникають біль та кровотеча. Для якого захворювання характерна така клінічна картина?

- A. Червоний плоский лишай
- B. Хронічний гіперпластичний кандидоз
- C. Туберкульозний вовчак
- D.*Червоний вовчак
- E. Вторинний сифіліс