

4.4.0.0 Щелепно-лицева ортопедія

1. Лікар фіксує двохщелепну дротяну шину з зачіпними петлями для іммобілізації перелому нижньої щелепи в ділянці тіла справа зі зміщенням відламків. В якому напрямку повинні бути орієнтовані зачіпні гачки?

*А. На верхній щелепі вгору, на нижній щелепі вниз

В. На верхній щелепі вниз, на нижній щелепі вгору

С. На обох щелепах вгору

Д. На обох щелепах вниз

Е. Напрямок зачіпних гачків не має ніякого значення

2. У хворого 57-ми років в результаті вогнепального поранення утворився дефект орбіти. Було запропоновано виготовити протез орбіти. Яким пристроєм доцільно фіксувати ектопротез у даного хворого?

*А. На окулярній оправі

В. На спеціальних фіксаторах

С. На клею

Д. На тасьмі

Е. Липкою стрічкою

3. У пацієнта віком 27 років внаслідок побутової травми стався перелом у боковій ділянці тіла нижньої щелепи зліва зі зміщенням. Об'єктивно спостерігається: цілісність зубного ряду збережена, лінія перелому проходить між 36 і 37 зубами. Яку шину треба застосувати для постійної іммобілізації щелепи?

Гладка шина-скоба

Апарат Рудько

Міжщелепне лігатурне зв'язування за Айві

*Двощелепна назубна шина Тігерштедта із зачіпними гачками, міжщелепна гумова тяга

Двощелепна назубна шина Тігерштедта із розпірковим вигином, міжщелепна гумова тяга

4. Хвора 68-ми років звернулася в стоматологічне відділення з діагнозом: перелом нижньої щелепи справа в ділянці кута зі зміщенням відламків. Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок посттравматичного набряку, при пальпації відзначається рухомість уламків в ділянці перелому, біль. Кількість

зубів на щелепах та їх якість достатня для консервативного лікування. В анамнезі: епілепсія з народження. Епілептичні напади щомісяця. Який метод лікування запропонуєте?

Імобілізація щелеп шинами Васильєва

Імобілізація шиною Порта

Імобілізація щелеп шинами Тігерштедта

Імобілізація шиною Ванкевича

*Остеосинтез

5. У хворого односторонній лінійний перелом в ділянці кута нижньої щелепи. Зроблена імобілізація з накладенням двущелепної назубної дротяної шини із зачіпними петлями і міжщелепним еластичним витягуванням. Загоєння перебігало без ускладнень. Який оптимальний термін для зняття шини?

Через 1 місяць

Через 10 днів

Через тиждень

*Через 3 тижня

Через 2 тижні

6. Хворому 42-х років для виготовлення ектопротезу необхідно отримати маску обличчя за Гіпократом. Який відбитковий матеріал слід використати?

А. Стомальгін

В. Стомафлекс

С. *Гіпс

Д. Стенс

Е. Дентафоль