

Вроджені вади розвитку щелепно-лицевої ділянки у дітей

1. Мати одномісячної дівчинки звернулася до щелепно-лицевого лікаря-хірурга зі скаргами на наявність у дитини дефекту тканин верхньої губи, неможливість ссати груди і природно харчуватися. Під час огляду дитини визначається лівобічний дефект верхньої губи, що розповсюджується на 2/3 висоти губи, з порушенням цілісності лінії Купідона та кругового м'яза. Альвеолярний відросток верхньої щелепи та піднебіння клінічно не змінені. Який діагноз можна встановити у цьому разі?

- A. Вроджена прихована лівобічна щілина верхньої губи
- B. Вроджена наскрізна лівобічна щілина верхньої губи
- C. *Вроджена неповна ізольована лівобічна щілина верхньої губи
- D. Вроджена повна ізольована лівобічна щілина верхньої губи

2. Під час обстеження лікарем-стоматологом шестирічного хлопчика об'єктивно спостерігається: відкривання рота вільне, альвеолярний відросток верхньої щелепи цілий, але м'яке і тверде піднебіння незрощене до рівня 16, 26 зубів, має трикутну форму, мова невиразна, м'яке піднебіння вкорочене. Дитина народилася із цією вагою. Яка патологія розвитку щелепно-лицевої ділянки у дитини?

- A. Приховане незрощення піднебіння
- B. Повне незрощення піднебіння
- C. Комбіноване незрощення піднебіння
- D. *Часткове незрощення піднебіння

3. Після проведення обстеження шестимісячної дитини був встановлений діагноз: повне незрощення верхньої губи. Яку пластичну операцію для усунення дефекту треба провести у цьому разі?

- A. Френулоектомію
- B. *Хейлопластику
- C. Френулотомію
- D. Уранопластику
- E. Ураностафілопластику

4. У відділенні ЩЛХ у хлопчика 2-х місяців діагностовано повне ізольоване вроджене двобічне незрощення верхньої губи. Загальносоматичних захворювань у дитини не виявлено. В якому віці найбільш оптимально провести одноетапну хейлопластику?

- A. 6-12 місяців
- B. 1-3 місяців
- C. 6-7 років
- D. 1-2 роки
- E. *3-6 місяців

5. Мати звернулася до лікаря з двомісячним хлопчиком, в якого спостерігається втягнутість шкіри в проекції лівої колонки верхньої губи з западиною на червоній облямівці. Який діагноз є найбільш імовірним?

- A. Вроджена часткова лівобічна щілина верхньої губи
- B. Вроджена наскрізна лівобічна щілина верхньої губи
- C. Колобома
- D. Посттравматичний рубець верхньої губи
- E. *Вроджена прихована лівобічна щілина верхньої губи

6. Хлопчиківі 6 років. Відкривання рота вільне. Альвеолярний відросток верхньої щелепи цілий, але м'яке і тверде піднебіння незрощене до рівня 16, 26 зубів. Має трикутну форму. Мова невиразна. М'яке піднебіння вкорочене. Дитина народилася з даною вадою. Який імовірний діагноз?

- A. Приховане незрощення піднебіння
- B. *Часткове незрощення піднебіння
- C. Повне незрощення піднебіння
- D. Комбіноване незрощення піднебіння

7. Після проведення обстеження хворого 6-ти місяців йому був встановлений діагноз: повне незрощення верхньої губи. Яку пластичну операцію усунення дефекту слід провести в даному випадку?

- A. Хейлопластика
- B. Френулоектомія
- C. Ураностафілопластика
- D. *Френулотомія
- E. Уранопластика

8. У новонародженої дитини виявлено вроджений дефект верхньої губи зліва. В які періоди ембріонального розвитку можуть формуватися вроджені вади верхньої губи?

- A. *Протягом 2-го місяця розвитку плода

- В. Протягом 5-го місяця розвитку плода
- С. Протягом 6-го місяця розвитку плода
- Д. Протягом 4-го місяця розвитку плода
- Е. Протягом 3-го місяця розвитку плода

9. У пацієнта діагностовано недорозвинення нижньої щелепи, щілина твердого та м'якого піднебіння, глосоптоз. Який синдром виявлено у пацієнта?

- А. *Робена
- В. Шегрена
- С. Горліна –Гольтця
- Д. Гольденхара
- Д. Костена