

4.3.0.0 Повна відсутність зубів

1. Під час обстеження порожнини рота хворої 67-ми років на фоні повної відсутності зубів, виявлений "рухливий альвеолярний гребінь" на верхній щелепі; атрофія 2 ступеня за Шредером. Слизова оболонка помірно рухлива. Якому відбитку за ступенем компресії слід віддати перевагу?

А. Диференційований

*В. Компресійний

С. Декомпресійний

Д. Комбінований

Е. З тиском

2. Хвора 72-х років звернулася до лікаря зі скаргами на неможливість користування повними знімними протезами, які було виготовлено 3 тижні тому. До протезів звикає важко. Під час розмови, пережовування їжі протези стукотять, жувальні м'язи втомлюються, під протезами виникає біль. Яка допущена помилка при виготовленні протезів?

*А. Завищена висота центральної оклюзії

В. Визначена бокова оклюзія

С. Визначена задня оклюзія

Д. Зафіксована передня оклюзія

Е. Знижена висота центральної оклюзії

3. Хворому 48-ми років, з діагнозом повна вторинна адентія зубів на верхній щелепі, було виготовлено повний знімний протез. Через 3 дні після його фіксації хворий звернувся зі скаргами на біль під час їжі. Під час огляду: слизова оболонка перехідної складки в зоні верхніх премолярів і молярів справа різко гіперемована. Яка тактика у даному випадку?

*А. Провести корекцію краю протеза справа

В. Провести корекцію краю протеза зліва

С. Переробити постановку зубів

Д. Переробити протез

Е. Пришліфувати жувальні зуби на нижній щелепі справа

4. В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 72-х років, якому 10 днів тому були виготовлені повні знімні протези, із скаргами на погану фіксацію протезів під час відкушування їжі. Об'єктивно: зуби верхнього

протеза перекривають зуби нижнього протеза більше ніж на 1/3. Яка помилка була допущена?

*А. Невірна постановка передніх зубів

В. Невірно визначена центральна оклюзія

С. Невірно визначена висота центральної оклюзії

Д. Невірно проведена припасовка індивідуальної ложки

Е. Невірно проведена постановка бічних зубів

5. При визначенні характеру контактів між зубами та протезом в положенні центральної оклюзії хворому наклали на зуби розігрітий віск і декілька разів попросили накусити. В окремих місцях віск був прокушений до дірок. Що було внаслідок цього встановлено?

*А. Точки передчасного контакту

В. Нормальне співвідношення контактів зубів

С. Зміщення нижньої щелепи під час обстеження

Д. Завищення прикусу в місцях прокусу

Е. —

6. В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 70-ти років, якому 10 днів тому були виготовлені повні знімні протези, із скаргами на погану фіксацію протезів під час відкушування їжі. Об'єктивно: зуби верхнього протеза перекривають зуби нижнього протеза більше ніж на 1/3. Яка помилка була допущена?

*А. Невірна постановка передніх зубів

В. Невірно визначена центральна оклюзія

С. Невірно визначена висота центральної оклюзії

Д. Невірно проведена припасовка індивідуальної ложки

Е. Невірно проведена постановка бічних зубів

7. При визначенні характеру контактів між зубами та протезом в положенні центральної оклюзії хворому наклали на зуби розігрітий віск і декілька разів попросили накусити. В окремих місцях віск був прокушений до дірок. Що було внаслідок цього встановлено?

*А. Точки передчасного контакту

В. Нормальне співвідношення контактів зубів

С. Зміщення нижньої щелепи під час обстеження

Д. Завищення прикусу в місцях прокусу

Е. –

8. Хворому в клініці було виготовлено повний знімний протез на верхню щелепу, через декілька днів він звернувся до лікарні зі скаргами на відчуття печіння під протезом та біль під час користування протезом. Під час огляду слизова оболонка має темно-вишневий колір, набрякла, спостерігаються ділянки з порушенням цілісності епітелію у вигляді ерозії та поліпозних розростань. Який найбільш імовірний діагноз?

*А. Розлитий хронічний протезний стоматит з гіперплазією

В. Травматичний хронічний катаральний протезний стоматит

С. Травматичний хронічний виразковий стоматит

Д. Вогнищевий хронічний катаральний протезний стоматит

Е. Вогнищевий хронічний виразковий стоматит

9. При постановці штучних зубів у повних знімних протезах на верхню щелепу зубний технік розташував бічні зуби нижньої щелепи так, що їх оклюзійна поверхня у трансверзальній площині являє собою увігнуту криву. Ім'я якого науковця носить ця крива?

*А. Уілсон

В. Шпее

С. Енгль

Д. Ендрюс

Е. Христенсен

10. На етапі визначення центральної оклюзії при виготовленні повних знімних протезів пацієнту 72-х років лікар визначає орієнтири для підбору і постановки штучних зубів. Відносно якого орієнтира зубний технік формує оклюзійні криві при постановці штучних зубів за методом Васильєва?

*А. Протетична площина

В. Сагітальна площина

С. Лінія ікол

Д. Лінія посмішки

Е. Лінія косметичного центру

11. Пацієнт віком 68 років упродовж 5-ти років користується повним знімним протезом. За цей час фіксація протеза повільно погіршувалася. Об'єктивно спостерігається: протез майже повністю не прилягає до слизової оболонки по перехідній клапанній зоні. Відсутня повноцінна фіксація та стабілізація протеза. Як можна використати цей протез?

- A. Використати старий протез при визначенні висоти центральної оклюзії
- B. Залишити старий протез після виконання перебазування
- C. Залишити старі штучні зуби лише замінивши базис протеза
- D. *Використати протез у якості індивідуальної ложки
- E. Залишити старий базис, замінивши штучні зуби

12. Під час припасування індивідуальної ложки на верхній щелепі пацієнта віком 49 років при широкому відкриванні рота відбувається її скидання. Де необхідно вкоротити край ложки?

- A. У ділянці торуса
- B. *У задньо-бічній ділянці горбів в/щ
- C. По лінії 'А'
- D. У ділянці щічних складок
- E. У фронтальній ділянці

13. Жінці віком 68 років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелепи. Об'єктивно спостерігається: альвеолярні відростки щелеп незначно атрофовані, слизова оболонка помірно піддатлива. Було отримано анатомічні відбитки та виготовлено гіпсові моделі щелеп. Який етап протезування цієї пацієнтки повинен бути наступним?

- A. Перевірка конструкції протезів
- B. Визначення центрального співвідношення щелеп
- C. Виготовлення воскових базисів з прикусними валиками
- D.*Виготовлення індивідуальних ложок
- E. Отримання функціональних відбитків

14. Пацієнт віком 66 років скаржиться на біль у жувальних м'язах і скронево-нижньощелепному суглобі. Протези виготовлені 1 місяць тому. Об'єктивно спостерігається: конфігурація лиця порушена, нижня третина його подовжена, губи змикаються з напруженням, дикція порушена. Під час

посмішки оголюється базис повного знімного протеза. Які дефекти допущені під час виготовлення повних знімних протезів на верхню щелепу?

- A. Визначена задня оклюзія
- B. Знижена висота прикусу
- C. Неправильна постановка зубів на верхній щелепі
- D. *Підвищена висота прикусу

Визначена передня оклюзія

15. Пацієнтці віком 50 років планується виготовлення знімних протезів на обидві щелепи з опорою на імпланти. Обирається вид імплантації, необхідна кількість імплантів та їх розташування. Використання якого додаткового методу дослідження дозволить виконати це найефективніше?

- A. Прицільна рентгенографія
- B. *Комп'ютерна томографія
- C. Вивчення діагностичних моделей
- D. Ультразвукова денситометрія

E. Оклюзіографія

16. Пацієнт віком 67 років користується повними знімними протезами впродовж 17 років. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка коміркового відростка верхньої щелепи гіперемована, набрякла, на внутрішній поверхні базису протеза пори заповнені залишками їжі. Який діагноз у цього ускладнення?

Обмежений токсичний стоматит

Обмежений токсичний бактеріальний стоматит

Вогнищевий токсичний бактеріальний стоматит

Обмежений токсичний протезний стоматит

*Обмежений бактеріальний протезний стоматит

17. Пацієнту 54-х років виготовляються повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. При перевірці постановки штучних зубів визначається випинання верхньої губи. На якому етапі лікування виникло це ускладнення?

- A. Фіксація центрального співвідношення
- B. Фіксація висоти прикусу

С. Формування оклюзійної поверхні

Д. *Формування вестибулярної поверхні прикусного валику

Формування протетичної площини

18. Пацієнт 72-х років звернувся зі скаргами на неможливість користування повними знімними протезами через біль у скронево-нижньощелепних суглобах та жувальних м'язах. Протези виготовлені 2 тижні тому.

Об'єктивно: нижня третина обличчя подовжена, кути рота припідняті, губи змикаються з напруженням, при посмішці видно базис протезу на верхню щелепу. Яка помилка допущена?

*Неправильно визначена центральна оклюзія

Неправильно вибрані розміри штучних зубів

Неправильно виконана постановка зубів

Неправильно нанесена лінія посмішки на прикусні валики

Неправильно зняті функціональні відбитки

19. При огляді беззубої нижньої щелепи у пацієнтки 52-х років виявлені екзостози в ділянці премоларів з обох сторін. Від хірургічної підготовки порожнини рота пацієнтка відмовилась. Який вид протезів потрібно запропонувати у даному випадку?

Повний знімний пластинковий протез з нейлону

*Повний знімний пластинковий протез з еластичною підкладкою

Повний знімний пластинковий протез з акриловим базисом

Повний знімний пластинковий протез з прозорим акриловим базисом

Повний знімний пластинковий протез з металевим базисом

20. Пацієнту 54-х років виготовляються повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. При перевірці постановки штучних зубів визначається випинання верхньої губи. На якому етапі лікування виникло це ускладнення?

Формування протетичної площини

Фіксація висоти прикусу

Формування оклюзійної поверхні

Фіксація центрального співвідношення

*Формування вестибулярної поверхні прикусного валику

21. Пацієнт 72-х років звернувся зі скаргами на неможливість користування повними знімними протезами через біль у скронево-нижньощелепних суглобах та жувальних м'язах. Протези виготовлені 2 тижні тому.

Об'єктивно: нижня третина обличчя подовжена, кути рота припідняті, губи змикаються з напруженням, при посмішці видно базис протезу на верхню щелепу. Яка помилка допущена?

Неправильно вибрані розміри штучних зубів

Неправильно зняті функціональні відбитки

Неправильно нанесена лінія посмішки на прикусні валики

*Неправильно визначена центральна оклюзія

Неправильно виконана постановка зубів

22. При огляді беззубої нижньої щелепи у пацієнтки 52-х років виявлені екзостози в ділянці премолярів з обох сторін. Від хірургічної підготовки порожнини рота пацієнтка відмовилась. Який вид протезів потрібно запропонувати у даному випадку?

Повний знімний пластинковий протез з нейлону

Повний знімний пластинковий протез з прозорим акриловим базисом

Повний знімний пластинковий протез з металевим базисом

*Повний знімний пластинковий протез з еластичною підкладкою

Повний знімний пластинковий протез з акриловим базисом

23. Хворий 65-ти років звернувся зі скаргами на повну відсутність зубів на верхній щелепі. Об'єктивно: при обстеженні протезного ложа верхньої щелепи виявлено стан слизової оболонки за Супле 2 клас. Який відбиток треба одержати?

Комбінований

Компресійний

*Декомпресійний

Функціональний

Анатомічний