

2.5.0.0 Захворювання пародонту

1. У шестирічної дитини на апроксимально-медіальній поверхні 75 зуба виявлена каріозна порожнина заповнена яскраво-червоною тканиною, що легко кровоточить і болить під час зондування. Міжзубний сосочок у ділянці 74 і 75 зубів гіперемований та набряклий. Вкажіть найбільш доступний діагностичний спосіб, який треба застосувати для диференціальної діагностики хронічного гіпертрофічного пульпіту і гіпертрофічного папіліту.

Порівняльне зондування

- A. Термічна проба
- B. Порівняльна перкусія
- C. Рентгенологічне дослідження
- D. *Провести зондом навколо шийки зуба

2.5.1.0 Гінгівіт

2.5.2.0 Катаральний гінгівіт

1. Батьки десятирічної дівчинки скаржаться на кровоточивість ясен у дитини під час вживання жорсткої їжі та чищення зубів. Об'єктивно спостерігається: набряк, застійна гіперемія та легка кровоточивість ясен обох щелеп, велика кількість м'якого нальоту в ділянках шийок зубів та над'ясенний зубний камінь у зоні нижніх фронтальних зубів. Порушення цілісності зубо-ясенного з'єднання немає. На рентгенограмі зміни кісткової тканини альвеолярних відростків відсутні. Дитина соматично здорова. Установлено діагноз: хронічний катаральний гінгівіт. Із чого потрібно розпочати лікування захворювання у дитини?

- A. Протизапальної терапії
- B. Консультації у педіатра
- *C. Професійної гігієни
- D.-
- E. Корекції індивідуальної гігієни

2. Юнак віком 16 років звернувся до лікаря-стоматолога для профілактичного огляду. Об'єктивно спостерігається: зуби інтактні, але тісно розміщені, ясенні сосочки незначно збільшені та гіперемовані. Велика кількість м'якого зубного нальоту. Лікарем діагностовано хронічний катаральний гінгівіт та проведено

професійне чищення зубів із гігієнічним навчанням. Що доцільно рекомендувати для очищення апроксимальних поверхонь зубів цьому пацієнту?

А. Міжзубні стимулятори

*В. Ротовий іригатор

С. Зубні йоржики

Д. Нитки-флоси

Е. Зубочистки

2.5.3.0 Гіпертрофічний гінгівіт

1. Сімнадцятирічний юнак скаржиться на незвичний вигляд ясен. Об'єктивно спостерігається: маргінальний край вестибулярної поверхні ясен блідо-рожевого кольору, валикоподібно потовщений. Ясенні сосочки округлої форми, перекривають коронкові частини всіх зубів майже на 1/3 їх висоти, кровоточивість відсутня. На рентгенограмі верхньої та нижньої щелеп патологічних змін не виявлено. Який імовірний діагноз?

А. Фіброматоз ясен

*В. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт

С. Загострення катарального гінгівіту

Д. Генералізований пародонтит I ступеня

Е. Хронічний катаральний гінгівіт

2.5.4.0 Виразковий гінгівіт

1. Юнакові 18-ти років, що проживає в сільській місцевості і звернувся за допомогою до стоматологічного відділення центральної районної лікарні, на підставі скарг та результатів об'єктивного та мікробіологічного дослідження був встановлений діагноз: виразковий гінгівіт. Призначене загальносоматичне та симптоматичне лікування. З якої процедури необхідно розпочинати симптоматичне лікування в амбулаторних умовах?

А. Повне зняття зубних відкладень

В. Загальне знеболення

С. Аплікація розчинів протеолітичних ферментів на уражені поверхні

Д. *Зрошення слизової оболонки порожнини рота розчинами антисептиків

Е. Механічне очищення виразкових поверхонь

2. Батьки 13-річного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, гнилісний запах з рота, погане самопочуття, підвищення температури тіла у дитини до 37,80С*. Хворіє другий день. В анамнезі - переохолодження. Об'єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, ясенні сосочки вкриті брудно- сірим нальотом. Пальпація різко болісна. Зуби вкриті значним шаром м'якого зубного нальоту. Визначте збудника даного захворювання:

А.Вірус Епштейна-Барр

В.-

С.Вірус простого герпесу

Д.Дріжджеподібні гриби

Е.*Фузоспірилярний симбіоз

3. Дівчина віком 16 років скаржиться на кровоточивість та болючість ясен. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен набрякла, гіперемована, ясенні сосочки вкриті сірим некротичним нальотом. Регіональні лімфатичні вузли збільшені та болісні під час пальпації. У становить імовірний діагноз.

А. Гіпертрофічний гінгівіт

В. Локалізований пародонтит

*С. Виразковий гінгівіт

Д. Атрофічний гінгівіт

Е. Катаральний гінгівіт

2.5.5.0 Пародонтит

1. Підліток віком 15 років скаржиться на постійну кровоточивість ясен під час чищення зубів та вживання їжі. Об'єктивно спостерігається: набряк, гіперемія та ціаноз ясен у фронтальній ділянці нижньої щелепи, ясенні сосочки набряклі та легко кровоточать під час зондування. Наявні над'ясенні щільні зубні нашарування. Вкажіть додатковий метод обстеження для встановлення остаточного діагнозу.

А. Електроодонтодіагностика

В. Стоматоскопія

С. Телерентгенографія

Д. Реопародонтографія

*Е. Рентгенографія